

# Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie



# Températures lagonnaires

- Vers un suivi optimal des lagons et récifs -

Alexandre Ganachaud, Jéome Lefèvre, David Varillon Laboratoire d'Etudes en Géophysique et Océanographie Spatiales Institut de Recherche pour le Développement





NOAA Coral Reef Watch: Potentiel de blanchissement

Observations


Les coraux vivent ~ 2°C sous le seuil maximum de température

tolérable

NOAA/@Berkelman


La température et

les coraux





## La température océanique varie



Température océanique à l'Anse Vata: 1958-2010

Guyennon et al., en preparation





## Plan de l'exposé


 Variations grande échelle; Projections climatiques

De la grande échelle au polype

- Réseau IRD/CRIOBE/GOPS
- Mesures et calibration
- Projections GIEC à l'Anse Vata
- ... and then what ?




## Tendances grande échelle 1950-2000






## Les projections grande échelle du GIEC


- Scénario A2
- Sur des périodes de 20 ans (21 modèles):
  - 1990s = 1980-1999
  - 2035s= 2025-2044
  - 2090s= 2080-2099



## Modèles de projections climatiques







- 21 simulations:
- 1850-2000 puis 2000-2100


FAQ 1.2, Figure 1. Schematic view of the components of the climate system, their processes and interactions.

Source: GIEC 2007



## Les projections grande échelle du GIEC


- Scénario A2
- Sur des périodes de 20 ans (13 modèles):
  - 1990s = 1980-1999
  - 2035s= 2025-2044
  - 2090s= 2080-2099





## Les projections grande échelle du GIEC


- Scénario A2
- Sur des périodes de 20 ans (13 modèles):
  - 1990s = 1980-1999
  - 2035s= 2025-2044
  - 2090s= 2080-2099





# De l'océan hauturier à la patate

Courtesy J. Lefèvre, IRD



Simulation numérique, 9 Nov 2004


Lefèvre et al. 2010, Ganachaud et al. 2010a, b




## De l'océan hauturier à la patate

Courtesy J. Lefèvre, IRD

# Image haute résolution Satellite MODIS






Simulation numérique, 9 Nov 2004

Lefèvre et al. 2010, Ganachaud et al. 2010a, b




# De l'océan hauturier à la patate






#### 01-OCT-2002 12:00








# Réseau de stations côtières de température






## Couverture des données





### Couverture des données






## Calibration et homogénéisation


- Mesures au seau:
  - Heure de relevé
  - Modification du site / profondeur
  - Changement de manipulateur
  - Sérieux du manipulateur

- Capteurs automatiques:
  - Changements de technologie
  - Précision
  - Transition seau/capteur






# Calibration capteurs automatiques






## Calibration capteurs automatiques



Guyennon et al, TBS



# Homogéneisation (Météo-France)




Hypothèse: s'il y a un saut climatique, il se retrouve dans toutes les séries

Guyennon et al, TBS





## Séries calibrées et homogénéisées




Température océanique à l'Anse Vata: 1958-2010

Guyennon et al., TBS



## Séries calibrées et homogénéisées




Température océanique à l'Anse Vata: 1958-2010

Guyennon et al., TBS




# Variations saisonnières des différentes stations






### Et le futur ? Anse Vata 2100






## Et le futur? Anse Vata 2100





#### And then what?

- La température océanique varie, rapidement (heures) ou lentement (2-7 ans; décennal; tendances)
- Les variations peuvent être très inhomogènes dans le lagon et à l'extérieur
- Importance de mouiller un capteur lors de suivis de la santé des écosystèmes
- Nécessité d'un capteur de précision
- Possibilité de retrait après une période d'intercalibration



www.ird.nc/ECOP